

表 2065 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)							1	1
20~ (%)								
30~ (%)	5 (12.2)	35 (85.4)	1 (2.4)		41 (100.0)		19	60
40~ (%)	85 (18.1)	383 (81.7)	1 (0.2)		469 (100.0)		96	565
50~ (%)	130 (13.4)	834 (86.2)		3 (0.3)	967 (100.0)		179	1,146
60~ (%)	80 (11.6)	609 (88.4)			689 (100.0)		131	820
70~ (%)	38 (14.1)	232 (85.9)			270 (100.0)		41	311
80~ (%)	7 (7.6)	85 (92.4)			92 (100.0)		19	111
90~ (%)	2 (5.3)	35 (92.1)	1 (2.6)		38 (100.0)		4	42
100~ (%)	2 (20.0)	8 (80.0)			10 (100.0)			10
110~ (%)		6 (100.0)			6 (100.0)		1	7
120~ (%)	1 (16.7)	5 (83.3)			6 (100.0)			6
合計 (%)	350 (13.5)	2,232 (86.2)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,588 (100.0)		491	3,079
記載なし (%)	1 (2.7)	36 (97.3)			37 (100.0)		19	56
総計 (%)	351 (13.4)	2,268 (86.4)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,625 (100.0)		510	3,135
平均	58.19	60.00	61.13	53.27	59.75		58.15	59.49
標準偏差	11.48	12.25	32.30	3.26	12.18		11.57	12.10

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査