

表 2066 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)					15 (100.0)		2	17
20～ (%)	5 (33.3)	10 (66.7)						
30～ (%)	36 (9.7)	334 (90.3)			370 (100.0)		73	443
40～ (%)	101 (12.4)	710 (87.4)		1 (0.1)	812 (100.0)		148	960
50～ (%)	49 (11.4)	377 (88.1)	2 (0.5)		428 (100.0)		77	505
60～ (%)	16 (11.9)	118 (88.1)			134 (100.0)		28	162
70～ (%)	1 (4.0)	24 (96.0)			25 (100.0)		5	30
80～ (%)	1 (10.0)	9 (90.0)			10 (100.0)		5	15
90～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)			2
100～ (%)								
110～ (%)								
120～ (%)								
合計 (%)	209 (11.6)	1,584 (88.2)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,796 (100.0)		338	2,134
記載なし (%)	5 (15.6)	27 (84.4)			32 (100.0)		19	51
総計 (%)	214 (11.7)	1,611 (88.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,828 (100.0)		357	2,185
平均	47.12	47.28	55.25	41.30	47.27		47.72	47.34
標準偏差	8.93	9.43	1.34		9.37		9.85	9.45

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査