

表 2116 HDF希釈方法 体重減少量(kg)別（オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満	49	1		1	51			51
(%)	(96.1)	(2.0)		(2.0)	(100.0)			
0.0～	474	21		21	516		26	542
(%)	(91.9)	(4.1)		(4.1)	(100.0)			
1.0～	2,464	111		86	2,661		163	2,824
(%)	(92.6)	(4.2)		(3.2)	(100.0)			
2.0～	6,146	286		234	6,666	1	388	7,055
(%)	(92.2)	(4.3)		(3.5)	(100.0)			
3.0～	4,616	195		161	4,972		299	5,271
(%)	(92.8)	(3.9)		(3.2)	(100.0)			
4.0～	1,458	67		45	1,570		108	1,678
(%)	(92.9)	(4.3)		(2.9)	(100.0)			
5.0～	281	16		11	308		19	327
(%)	(91.2)	(5.2)		(3.6)	(100.0)			
6.0～	34	6		1	41		1	42
(%)	(82.9)	(14.6)		(2.4)	(100.0)			
7.0～	9			1	10			10
(%)	(90.0)			(10.0)	(100.0)			
8.0～	16			1	17		1	18
(%)	(94.1)			(5.9)	(100.0)			
合計	15,547	703		562	16,812	1	1,005	17,818
(%)	(92.5)	(4.2)		(3.3)	(100.0)			
記載なし	321	27		60	408		25	433
(%)	(78.7)	(6.6)		(14.7)	(100.0)			
総計	15,868	730		622	17,220	1	1,030	18,251
(%)	(92.1)	(4.2)		(3.6)	(100.0)			
平均	2.79	2.81		2.78	2.79	2.20	2.82	2.79
標準偏差	1.05	1.04		1.32	1.06		1.01	1.06

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査