

表 2117 HDF希釈方法 体重減少量(kg)別（オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満	28			1	29		3	32
(%)	(96.6)			(3.4)	(100.0)			
0.0～	437	19		19	475		52	527
(%)	(92.0)	(4.0)		(4.0)	(100.0)			
1.0～	2,734	141		108	2,983		214	3,197
(%)	(91.7)	(4.7)		(3.6)	(100.0)			
2.0～	4,364	214		162	4,740		284	5,024
(%)	(92.1)	(4.5)		(3.4)	(100.0)			
3.0～	1,274	57		44	1,375		95	1,470
(%)	(92.7)	(4.1)		(3.2)	(100.0)			
4.0～	161	10		5	176		9	185
(%)	(91.5)	(5.7)		(2.8)	(100.0)			
5.0～	18	1		1	20			20
(%)	(90.0)	(5.0)		(5.0)	(100.0)			
6.0～	5	1		1	7			7
(%)	(71.4)	(14.3)		(14.3)	(100.0)			
7.0～	3				3			3
(%)	(100.0)				(100.0)			
8.0～	5			1	6		1	7
(%)	(83.3)			(16.7)	(100.0)			
合計	9,029	443		342	9,814		658	10,472
(%)	(92.0)	(4.5)		(3.5)	(100.0)			
記載なし	165	17		37	219		14	233
(%)	(75.3)	(7.8)		(16.9)	(100.0)			
総計	9,194	460		379	10,033		672	10,705
(%)	(91.6)	(4.6)		(3.8)	(100.0)			
平均	2.24	2.21		2.25	2.24		2.14	2.23
標準偏差	0.84	0.79		0.99	0.84		1.01	0.85

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査