

表 2118 HDF希釈方法 体重減少率(%)別 (オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満	284	10		6	300		6	306
(%)	(94.7)	(3.3)		(2.0)	(100.0)			
1.0～	445	19		25	489		36	525
(%)	(91.0)	(3.9)		(5.1)	(100.0)			
2.0～	1,389	63		45	1,497		90	1,587
(%)	(92.8)	(4.2)		(3.0)	(100.0)			
3.0～	3,144	126		119	3,389		202	3,591
(%)	(92.8)	(3.7)		(3.5)	(100.0)			
4.0～	4,438	208		132	4,778	1	283	5,062
(%)	(92.9)	(4.4)		(2.8)	(100.0)			
5.0～	3,365	155		121	3,641		210	3,851
(%)	(92.4)	(4.3)		(3.3)	(100.0)			
6.0～	1,621	86		58	1,765		115	1,880
(%)	(91.8)	(4.9)		(3.3)	(100.0)			
7.0～	605	21		34	660		42	702
(%)	(91.7)	(3.2)		(5.2)	(100.0)			
8.0～	178	13		12	203		14	217
(%)	(87.7)	(6.4)		(5.9)	(100.0)			
9.0～	70	2		9	81		7	88
(%)	(86.4)	(2.5)		(11.1)	(100.0)			
合計	15,539	703		561	16,803	1	1,005	17,809
(%)	(92.5)	(4.2)		(3.3)	(100.0)			
記載なし	329	27		61	417		25	442
(%)	(78.9)	(6.5)		(14.6)	(100.0)			
総計	15,868	730		622	17,220	1	1,030	18,251
(%)	(92.1)	(4.2)		(3.6)	(100.0)			
平均	4.57	4.65		4.74	4.57	4.25	4.64	4.58
標準偏差	1.56	1.52		1.74	1.56		1.56	1.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査