

表 2119 HDF希釈方法 体重減少率(%)別 (オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満	149	5		8	162		17	179
(%)	(92.0)	(3.1)		(4.9)	(100.0)			
1.0～	302	13		6	321		41	362
(%)	(94.1)	(4.0)		(1.9)	(100.0)			
2.0～	787	39		40	866		63	929
(%)	(90.9)	(4.5)		(4.6)	(100.0)			
3.0～	1,822	96		58	1,976		130	2,106
(%)	(92.2)	(4.9)		(2.9)	(100.0)			
4.0～	2,387	126		72	2,585		173	2,758
(%)	(92.3)	(4.9)		(2.8)	(100.0)			
5.0～	1,979	92		86	2,157		132	2,289
(%)	(91.7)	(4.3)		(4.0)	(100.0)			
6.0～	1,028	47		44	1,119		62	1,181
(%)	(91.9)	(4.2)		(3.9)	(100.0)			
7.0～	402	17		16	435		29	464
(%)	(92.4)	(3.9)		(3.7)	(100.0)			
8.0～	115	5		8	128		3	131
(%)	(89.8)	(3.9)		(6.3)	(100.0)			
9.0～	53	3		3	59		7	66
(%)	(89.8)	(5.1)		(5.1)	(100.0)			
合計	9,024	443		341	9,808		657	10,465
(%)	(92.0)	(4.5)		(3.5)	(100.0)			
記載なし	170	17		38	225		15	240
(%)	(75.6)	(7.6)		(16.9)	(100.0)			
総計	9,194	460		379	10,033		672	10,705
(%)	(91.6)	(4.6)		(3.8)	(100.0)			
平均	4.62	4.57		4.73	4.62		4.42	4.60
標準偏差	1.60	1.52		1.75	1.61		1.69	1.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査