

表 2120 HDF希釈方法 透析前BUN(mg/dL)別（オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満	13			1	14		1	15
(%)	(92.9)			(7.1)	(100.0)			
20～	122	4		3	129		5	134
(%)	(94.6)	(3.1)		(2.3)	(100.0)			
30～	726	24		21	771		47	818
(%)	(94.2)	(3.1)		(2.7)	(100.0)			
40～	2,130	97		70	2,297		142	2,439
(%)	(92.7)	(4.2)		(3.0)	(100.0)			
50～	3,801	180		142	4,123	1	235	4,359
(%)	(92.2)	(4.4)		(3.4)	(100.0)			
60～	4,056	204		130	4,390		249	4,639
(%)	(92.4)	(4.6)		(3.0)	(100.0)			
70～	2,823	113		104	3,040		172	3,212
(%)	(92.9)	(3.7)		(3.4)	(100.0)			
80～	1,323	51		59	1,433		86	1,519
(%)	(92.3)	(3.6)		(4.1)	(100.0)			
90～	455	21		23	499		45	544
(%)	(91.2)	(4.2)		(4.6)	(100.0)			
100～	127	6		7	140		2	142
(%)	(90.7)	(4.3)		(5.0)	(100.0)			
110～	40	2		1	43		2	45
(%)	(93.0)	(4.7)		(2.3)	(100.0)			
120～	5	1		2	8			8
(%)	(62.5)	(12.5)		(25.0)	(100.0)			
合計	15,621	703		563	16,887	1	986	17,874
(%)	(92.5)	(4.2)		(3.3)	(100.0)			
記載なし	247	27		59	333		44	377
(%)	(74.2)	(8.1)		(17.7)	(100.0)			
総計	15,868	730		622	17,220	1	1,030	18,251
(%)	(92.1)	(4.2)		(3.6)	(100.0)			
平均	62.44	62.47		64.16	62.50	58.00	62.67	62.51
標準偏差	14.86	14.60		15.88	14.89		15.04	14.90

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査