

表 2121 HDF希釈方法 透析前BUN(mg/dL)別（オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満	7			2	9		3	12
(%)	(77.8)			(22.2)	(100.0)			
20～	82	3		4	89		8	97
(%)	(92.1)	(3.4)		(4.5)	(100.0)			
30～	451	22		20	493		36	529
(%)	(91.5)	(4.5)		(4.1)	(100.0)			
40～	1,296	58		38	1,392		80	1,472
(%)	(93.1)	(4.2)		(2.7)	(100.0)			
50～	2,175	100		86	2,361		140	2,501
(%)	(92.1)	(4.2)		(3.6)	(100.0)			
60～	2,313	118		92	2,523		182	2,705
(%)	(91.7)	(4.7)		(3.6)	(100.0)			
70～	1,596	84		50	1,730		110	1,840
(%)	(92.3)	(4.9)		(2.9)	(100.0)			
80～	752	45		32	829		40	869
(%)	(90.7)	(5.4)		(3.9)	(100.0)			
90～	291	13		14	318		18	336
(%)	(91.5)	(4.1)		(4.4)	(100.0)			
100～	78	1		1	80		6	86
(%)	(97.5)	(1.3)		(1.3)	(100.0)			
110～	18			1	19		3	22
(%)	(94.7)			(5.3)	(100.0)			
120～	7				7		1	8
(%)	(100.0)				(100.0)			
合計	9,066	444		340	9,850		627	10,477
(%)	(92.0)	(4.5)		(3.5)	(100.0)			
記載なし	128	16		39	183		45	228
(%)	(69.9)	(8.7)		(21.3)	(100.0)			
総計	9,194	460		379	10,033		672	10,705
(%)	(91.6)	(4.6)		(3.8)	(100.0)			
平均	62.22	62.59		62.01	62.23		61.78	62.20
標準偏差	15.20	14.33		15.81	15.18		15.50	15.20

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査