

表 2122 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満	6			1	7			7
(%)	(85.7)			(14.3)	(100.0)			
20～	5	1			6			6
(%)	(83.3)	(16.7)			(100.0)			
30～	162	5		12	179		9	188
(%)	(90.5)	(2.8)		(6.7)	(100.0)			
40～	2,157	103		103	2,363		151	2,514
(%)	(91.3)	(4.4)		(4.4)	(100.0)			
50～	5,566	267		220	6,053	1	339	6,393
(%)	(92.0)	(4.4)		(3.6)	(100.0)			
60～	4,550	194		149	4,893		311	5,204
(%)	(93.0)	(4.0)		(3.0)	(100.0)			
70～	1,960	81		61	2,102		137	2,239
(%)	(93.2)	(3.9)		(2.9)	(100.0)			
80～	738	36		9	783		37	820
(%)	(94.3)	(4.6)		(1.1)	(100.0)			
90～	272	14		3	289		15	304
(%)	(94.1)	(4.8)		(1.0)	(100.0)			
100～	89	1		2	92		4	96
(%)	(96.7)	(1.1)		(2.2)	(100.0)			
110～	32			2	34		1	35
(%)	(94.1)			(5.9)	(100.0)			
120～	22	1		1	24		1	25
(%)	(91.7)	(4.2)		(4.2)	(100.0)			
合計	15,559	703		563	16,825	1	1,005	17,831
(%)	(92.5)	(4.2)		(3.3)	(100.0)			
記載なし	309	27		59	395		25	420
(%)	(78.2)	(6.8)		(14.9)	(100.0)			
総計	15,868	730		622	17,220	1	1,030	18,251
(%)	(92.1)	(4.2)		(3.6)	(100.0)			
平均	61.43	60.78		58.59	61.31	51.80	61.05	61.29
標準偏差	12.26	11.97		12.03	12.25		11.47	12.21

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査