

表 2123 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満	2	1			3			3
(%)	(66.7)	(33.3)			(100.0)			
20～	33			5	38		3	41
(%)	(86.8)			(13.2)	(100.0)			
30～	1,388	75		54	1,517		110	1,627
(%)	(91.5)	(4.9)		(3.6)	(100.0)			
40～	4,055	203		170	4,428		310	4,738
(%)	(91.6)	(4.6)		(3.8)	(100.0)			
50～	2,396	115		81	2,592		157	2,749
(%)	(92.4)	(4.4)		(3.1)	(100.0)			
60～	800	30		25	855		53	908
(%)	(93.6)	(3.5)		(2.9)	(100.0)			
70～	246	12		5	263		18	281
(%)	(93.5)	(4.6)		(1.9)	(100.0)			
80～	93	8		1	102		5	107
(%)	(91.2)	(7.8)		(1.0)	(100.0)			
90～	16			1	17		2	19
(%)	(94.1)			(5.9)	(100.0)			
100～	3				3			3
(%)	(100.0)				(100.0)			
110～	4				4			4
(%)	(100.0)				(100.0)			
120～								
(%)								
合計	9,036	444		342	9,822		658	10,480
(%)	(92.0)	(4.5)		(3.5)	(100.0)			
記載なし	158	16		37	211		14	225
(%)	(74.9)	(7.6)		(17.5)	(100.0)			
総計	9,194	460		379	10,033		672	10,705
(%)	(91.6)	(4.6)		(3.8)	(100.0)			
平均	49.08	48.77		47.62	49.01		48.42	48.98
標準偏差	10.13	10.12		9.32	10.10		9.84	10.09

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査