

表 2125 HDF希釈方法 equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	5 (83.3)			1 (16.7)	6 (100.0)		1	7
0.4～ (%)	3 (100.0)				3 (100.0)		2	5
0.6～ (%)	35 (89.7)	2 (5.1)		2 (5.1)	39 (100.0)		3	42
0.8～ (%)	203 (87.5)	18 (7.8)		11 (4.7)	232 (100.0)		14	246
1.0～ (%)	941 (89.9)	52 (5.0)		54 (5.2)	1,047 (100.0)		69	1,116
1.2～ (%)	2,109 (92.0)	97 (4.2)		86 (3.8)	2,292 (100.0)		139	2,431
1.4～ (%)	2,621 (92.6)	133 (4.7)		75 (2.7)	2,829 (100.0)		179	3,008
1.6～ (%)	1,613 (91.7)	87 (4.9)		59 (3.4)	1,759 (100.0)		116	1,875
1.8～ (%)	657 (94.4)	27 (3.9)		12 (1.7)	696 (100.0)		55	751
2.0～ (%)	505 (94.7)	20 (3.8)		8 (1.5)	533 (100.0)		23	556
合計 (%)	8,692 (92.1)	436 (4.6)		308 (3.3)	9,436 (100.0)		601	10,037
記載なし (%)	502 (84.1)	24 (4.0)		71 (11.9)	597 (100.0)		71	668
総計 (%)	9,194 (91.6)	460 (4.6)		379 (3.8)	10,033 (100.0)		672	10,705
平均	1.50	1.47		1.41	1.49		1.48	1.49
標準偏差	0.30	0.29		0.29	0.30		0.30	0.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査