

表 551 糖尿病の既往 治療方法別（透析患者全体）

| 治療方法 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|--------|---------|
| 施設血液透析 (%) | 104,592 (47.4) | 116,082 (52.6) | 220,674 (100.0) | 272 | 34,695 | 255,641 |
| 血液透析濾過 (%) | 20,116 (54.5) | 16,821 (45.5) | 36,937 (100.0) | 53 | 6,293 | 43,283 |
| 血液濾過 (%) | 12 (22.6) | 41 (77.4) | 53 (100.0) | | 39 | 92 |
| 血液吸着透析 (%) | 1,214 (89.9) | 137 (10.1) | 1,351 (100.0) | 1 | 278 | 1,630 |
| 在宅血液透析 (%) | 297 (76.2) | 93 (23.8) | 390 (100.0) | 6 | 125 | 521 |
| 腹膜透析 (%) | 3,673 (53.0) | 3,252 (47.0) | 6,925 (100.0) | 26 | 1,990 | 8,941 |
| 合計 (%) | 129,904 (48.8) | 136,426 (51.2) | 266,330 (100.0) | 358 | 43,420 | 310,108 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 129,904 (48.8) | 136,426 (51.2) | 266,330 (100.0) | 358 | 43,420 | 310,108 |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査