

表 552 糖尿病の既往 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	104,592	116,082	220,674	272	34,695	255,641
(%)	(47.4)	(52.6)	(100.0)			
Off-line HDF	3,067	2,259	5,326	7	982	6,315
(%)	(57.6)	(42.4)	(100.0)			
On-line HDF	16,742	14,151	30,893	45	5,152	36,090
(%)	(54.2)	(45.8)	(100.0)			
Push/Pull HDF	148	262	410		127	537
(%)	(36.1)	(63.9)	(100.0)			
ハイオフィルトレーション	159	149	308	1	32	341
(%)	(51.6)	(48.4)	(100.0)			
血液濾過	12	41	53		39	92
(%)	(22.6)	(77.4)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル)	1,212	134	1,346	1	276	1,623
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
血液吸着透析 (その他)	2	3	5		2	7
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)			
在宅血液透析	297	93	390	6	125	521
(%)	(76.2)	(23.8)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	1,960	1,833	3,793	13	1,215	5,021
(%)	(51.7)	(48.3)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,191	1,048	2,239	7	593	2,839
(%)	(53.2)	(46.8)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	522	371	893	6	182	1,081
(%)	(58.5)	(41.5)	(100.0)			
合計	129,904	136,426	266,330	358	43,420	310,108
(%)	(48.8)	(51.2)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	129,904	136,426	266,330	358	43,420	310,108
(%)	(48.8)	(51.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
 *腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査