

表 564 糖尿病の既往 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
なし	8,013	4,115	12,128	16	45	12,189
(%)	(66.1)	(33.9)	(100.0)			
あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	359	123	482		43	525
(%)	(74.5)	(25.5)	(100.0)			
あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	15		15		1	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	50	16	66		2	68
(%)	(75.8)	(24.2)	(100.0)			
あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	55	10	65		2	67
(%)	(84.6)	(15.4)	(100.0)			
合計	8,492	4,264	12,756	16	93	12,865
(%)	(66.6)	(33.4)	(100.0)			
不明	178	98	276	17	11	304
(%)	(64.5)	(35.5)	(100.0)			
記載なし	317	1,190	1,507	5	2,449	3,961
(%)	(21.0)	(79.0)	(100.0)			
総計	8,987	5,552	14,539	38	2,553	17,130
(%)	(61.8)	(38.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査