

表 573 糖尿病の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（透析患者全体）

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	72 (41.6)	101 (58.4)	173 (100.0)	1	11	185
1.5～ (%)	353 (39.8)	533 (60.2)	886 (100.0)	6	97	989
2.0～ (%)	1,580 (42.9)	2,105 (57.1)	3,685 (100.0)	8	368	4,061
2.5～ (%)	6,529 (47.0)	7,374 (53.0)	13,903 (100.0)	24	1,509	15,436
3.0～ (%)	29,653 (49.7)	30,019 (50.3)	59,672 (100.0)	79	6,357	66,108
3.5～ (%)	62,206 (50.9)	59,964 (49.1)	122,170 (100.0)	109	12,956	135,235
4.0～ (%)	23,054 (50.7)	22,427 (49.3)	45,481 (100.0)	41	4,986	50,508
4.5～ (%)	1,474 (56.2)	1,150 (43.8)	2,624 (100.0)	4	286	2,914
5.0～ (%)	115 (59.9)	77 (40.1)	192 (100.0)		11	203
合計 (%)	125,036 (50.3)	123,750 (49.7)	248,786 (100.0)	272	26,581	275,639
記載なし (%)	4,868 (27.7)	12,676 (72.3)	17,544 (100.0)	86	16,839	34,469
総計 (%)	129,904 (48.8)	136,426 (51.2)	266,330 (100.0)	358	43,420	310,108
平均	3.61	3.58	3.60	3.47	3.60	3.60
標準偏差	0.43	0.45	0.44	0.56	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査