

表 574 糖尿病の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	63,206 (51.7)	59,098 (48.3)	122,304 (100.0)	117	12,888	135,309
0.2～ (%)	20,014 (49.1)	20,720 (50.9)	40,734 (100.0)	40	4,033	44,807
0.5～ (%)	9,742 (47.3)	10,833 (52.7)	20,575 (100.0)	26	2,156	22,757
1.0～ (%)	6,290 (46.9)	7,120 (53.1)	13,410 (100.0)	21	1,317	14,748
2.0～ (%)	3,786 (46.4)	4,367 (53.6)	8,153 (100.0)	13	839	9,005
4.0～ (%)	1,359 (46.7)	1,550 (53.3)	2,909 (100.0)	7	328	3,244
6.0～ (%)	651 (45.9)	768 (54.1)	1,419 (100.0)	5	152	1,576
8.0～ (%)	348 (44.6)	433 (55.4)	781 (100.0)	2	87	870
10.0～ (%)	437 (46.4)	504 (53.6)	941 (100.0)	1	92	1,034
15.0～ (%)	279 (45.2)	338 (54.8)	617 (100.0)	3	73	693
合計 (%)	106,112 (50.1)	105,731 (49.9)	211,843 (100.0)	235	21,965	234,043
記載なし (%)	23,792 (43.7)	30,695 (56.3)	54,487 (100.0)	123	21,455	76,065
総計 (%)	129,904 (48.8)	136,426 (51.2)	266,330 (100.0)	358	43,420	310,108
平均	0.59	0.67	0.63	1.33	0.63	0.63
標準偏差	1.87	1.96	1.92	4.80	1.91	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査