

表 575 糖尿病の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	525 (50.4)	517 (49.6)	1,042 (100.0)	1	99	1,142
7.0～ (%)	735 (49.5)	751 (50.5)	1,486 (100.0)	1	162	1,649
7.5～ (%)	2,760 (48.1)	2,983 (51.9)	5,743 (100.0)	4	652	6,399
8.0～ (%)	8,329 (45.0)	10,180 (55.0)	18,509 (100.0)	13	1,917	20,439
8.4～ (%)	2,467 (46.1)	2,886 (53.9)	5,353 (100.0)	4	515	5,872
8.5～ (%)	28,435 (46.6)	32,646 (53.4)	61,081 (100.0)	71	6,167	67,319
9.0～ (%)	37,128 (50.0)	37,083 (50.0)	74,211 (100.0)	91	7,702	82,004
9.5～ (%)	26,218 (54.0)	22,341 (46.0)	48,559 (100.0)	47	5,363	53,969
10.0～ (%)	3,287 (55.6)	2,624 (44.4)	5,911 (100.0)	7	680	6,598
10.1～ (%)	8,579 (56.7)	6,560 (43.3)	15,139 (100.0)	18	1,820	16,977
10.5～ (%)	4,200 (57.0)	3,171 (43.0)	7,371 (100.0)	4	895	8,270
11.0～ (%)	1,404 (57.0)	1,060 (43.0)	2,464 (100.0)	4	313	2,781
11.5～ (%)	474 (55.2)	385 (44.8)	859 (100.0)	2	112	973
12.0～ (%)	326 (54.2)	276 (45.8)	602 (100.0)		79	681
合計 (%)	124,867 (50.3)	123,463 (49.7)	248,330 (100.0)	267	26,476	275,073
記載なし (%)	5,037 (28.0)	12,963 (72.0)	18,000 (100.0)	91	16,944	35,035
総計 (%)	129,904 (48.8)	136,426 (51.2)	266,330 (100.0)	358	43,420	310,108
平均	9.23	9.14	9.18	9.22	9.22	9.19
標準偏差	0.75	0.73	0.74	0.68	0.76	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査