

表 576 糖尿病の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	4,586 (46.9)	5,189 (53.1)	9,775 (100.0)	9	1,102	10,886
3.0～ (%)	5,910 (48.4)	6,303 (51.6)	12,213 (100.0)	12	1,357	13,582
3.5～ (%)	10,430 (48.7)	11,004 (51.3)	21,434 (100.0)	31	2,217	23,682
4.0～ (%)	15,811 (49.6)	16,074 (50.4)	31,885 (100.0)	40	3,357	35,282
4.5～ (%)	19,122 (50.4)	18,850 (49.6)	37,972 (100.0)	38	4,049	42,059
5.0～ (%)	19,837 (51.6)	18,600 (48.4)	38,437 (100.0)	30	4,251	42,718
5.5～ (%)	17,125 (51.8)	15,966 (48.2)	33,091 (100.0)	30	3,584	36,705
6.0～ (%)	2,952 (52.7)	2,652 (47.3)	5,604 (100.0)	4	653	6,261
6.1～ (%)	9,628 (50.7)	9,363 (49.3)	18,991 (100.0)	19	2,099	21,109
6.5～ (%)	8,348 (50.6)	8,135 (49.4)	16,483 (100.0)	20	1,775	18,278
7.0～ (%)	5,041 (49.7)	5,101 (50.3)	10,142 (100.0)	13	1,122	11,277
7.5～ (%)	3,088 (49.8)	3,114 (50.2)	6,202 (100.0)	9	647	6,858
8.0～ (%)	1,805 (48.8)	1,892 (51.2)	3,697 (100.0)	4	352	4,053
8.5～ (%)	1,171 (50.5)	1,147 (49.5)	2,318 (100.0)	1	253	2,572
9.0～ (%)	1,812 (49.5)	1,850 (50.5)	3,662 (100.0)	8	407	4,077
合計 (%)	126,666 (50.3)	125,240 (49.7)	251,906 (100.0)	268	27,225	279,399
記載なし (%)	3,238 (22.4)	11,186 (77.6)	14,424 (100.0)	90	16,195	30,709
総計 (%)	129,904 (48.8)	136,426 (51.2)	266,330 (100.0)	358	43,420	310,108
平均	5.23	5.20	5.21	5.24	5.21	5.21
標準偏差	1.41	1.44	1.43	1.56	1.43	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査