

表 577 糖尿病の既往 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	5,417 (50.0)	5,413 (50.0)	10,830 (100.0)	10	1,033	11,873
20～ (%)	7,349 (47.6)	8,104 (52.4)	15,453 (100.0)	11	1,482	16,946
40～ (%)	7,889 (48.0)	8,532 (52.0)	16,421 (100.0)	15	1,580	18,016
60～ (%)	8,589 (48.9)	8,990 (51.1)	17,579 (100.0)	19	1,632	19,230
80～ (%)	8,800 (49.3)	9,058 (50.7)	17,858 (100.0)	23	1,732	19,613
100～ (%)	8,506 (49.0)	8,847 (51.0)	17,353 (100.0)	15	1,790	19,158
120～ (%)	8,326 (50.4)	8,183 (49.6)	16,509 (100.0)	14	1,699	18,222
140～ (%)	7,442 (48.9)	7,769 (51.1)	15,211 (100.0)	18	1,578	16,807
160～ (%)	6,853 (49.8)	6,919 (50.2)	13,772 (100.0)	12	1,389	15,173
180～ (%)	15,923 (51.0)	15,323 (49.0)	31,246 (100.0)	29	3,238	34,513
240～ (%)	199 (49.3)	205 (50.7)	404 (100.0)		40	444
241～ (%)	9,348 (52.3)	8,538 (47.7)	17,886 (100.0)	11	1,942	19,839
300～ (%)	5,519 (53.2)	4,864 (46.8)	10,383 (100.0)	13	1,130	11,526
360～ (%)	3,285 (55.0)	2,687 (45.0)	5,972 (100.0)	12	700	6,684
420～ (%)	1,971 (56.4)	1,526 (43.6)	3,497 (100.0)	6	422	3,925
480～ (%)	509 (58.8)	357 (41.2)	866 (100.0)	1	97	964
500～ (%)	810 (58.4)	577 (41.6)	1,387 (100.0)		177	1,564
540～ (%)	891 (58.7)	628 (41.3)	1,519 (100.0)	2	193	1,714
600～ (%)	1,601 (64.2)	894 (35.8)	2,495 (100.0)	3	301	2,799
800～ (%)	1,382 (71.7)	545 (28.3)	1,927 (100.0)	4	231	2,162
合計 (%)	110,609 (50.6)	107,959 (49.4)	218,568 (100.0)	218	22,386	241,172
記載なし (%)	2,153 (41.5)	3,041 (58.5)	5,194 (100.0)	38	1,152	6,384
総計 (%)	112,762 (50.4)	111,000 (49.6)	223,762 (100.0)	256	23,538	247,556
平均	181.38	160.92	171.28	192.17	180.75	172.17
標準偏差	182.50	138.74	162.69	201.06	175.14	163.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査