

表 582 糖尿病の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	1,314 (42.7)	1,765 (57.3)	3,079 (100.0)	2	329	3,410
50～ (%)	6,304 (43.4)	8,206 (56.6)	14,510 (100.0)	16	1,575	16,101
70～ (%)	15,229 (47.6)	16,785 (52.4)	32,014 (100.0)	34	3,521	35,569
90～ (%)	19,239 (50.5)	18,836 (49.5)	38,075 (100.0)	42	4,261	42,378
110～ (%)	16,361 (53.1)	14,464 (46.9)	30,825 (100.0)	30	3,348	34,203
130～ (%)	10,183 (54.1)	8,648 (45.9)	18,831 (100.0)	19	2,113	20,963
150～ (%)	5,052 (53.4)	4,405 (46.6)	9,457 (100.0)	12	1,121	10,590
170～ (%)	2,192 (51.6)	2,059 (48.4)	4,251 (100.0)	1	470	4,722
190～ (%)	822 (49.3)	844 (50.7)	1,666 (100.0)	2	141	1,809
210～ (%)	472 (47.5)	521 (52.5)	993 (100.0)	4	127	1,124
合計 (%)	77,168 (50.2)	76,533 (49.8)	153,701 (100.0)	162	17,006	170,869
記載なし (%)	52,736 (46.8)	59,893 (53.2)	112,629 (100.0)	196	26,414	139,239
総計 (%)	129,904 (48.8)	136,426 (51.2)	266,330 (100.0)	358	43,420	310,108
平均	108.80	105.29	107.05	107.96	107.35	107.08
標準偏差	33.09	34.03	33.60	35.37	33.61	33.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査