

表 583 糖尿病の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	27 (75.0)	9 (25.0)	36 (100.0)		4	40
60～ (%)	263 (69.9)	113 (30.1)	376 (100.0)		57	433
80～ (%)	1,977 (66.6)	992 (33.4)	2,969 (100.0)	8	361	3,338
100～ (%)	9,742 (62.4)	5,877 (37.6)	15,619 (100.0)	23	1,965	17,607
120～ (%)	27,785 (58.3)	19,843 (41.7)	47,628 (100.0)	63	5,580	53,271
140～ (%)	38,387 (52.5)	34,676 (47.5)	73,063 (100.0)	97	7,662	80,822
160～ (%)	23,673 (44.5)	29,520 (55.5)	53,193 (100.0)	52	4,950	58,195
180～ (%)	7,296 (35.4)	13,337 (64.6)	20,633 (100.0)	19	1,572	22,224
200～ (%)	1,410 (26.8)	3,851 (73.2)	5,261 (100.0)	4	281	5,546
220～ (%)	251 (23.2)	833 (76.8)	1,084 (100.0)	1	75	1,160
合計 (%)	110,811 (50.4)	109,051 (49.6)	219,862 (100.0)	267	22,507	242,636
記載なし (%)	19,093 (41.1)	27,375 (58.9)	46,468 (100.0)	91	20,913	67,472
総計 (%)	129,904 (48.8)	136,426 (51.2)	266,330 (100.0)	358	43,420	310,108
平均	147.21	155.81	151.47	147.32	147.79	151.13
標準偏差	23.20	24.60	24.29	23.94	23.33	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査