

表 608 糖尿病の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	40 (58.0)	29 (42.0)	69 (100.0)		7	76
2～ (%)	588 (39.1)	914 (60.9)	1,502 (100.0)		154	1,656
4～ (%)	2,810 (39.6)	4,286 (60.4)	7,096 (100.0)	10	689	7,795
6～ (%)	9,266 (42.0)	12,785 (58.0)	22,051 (100.0)	24	1,931	24,006
8～ (%)	19,947 (47.3)	22,184 (52.7)	42,131 (100.0)	43	3,941	46,115
10～ (%)	23,009 (53.0)	20,393 (47.0)	43,402 (100.0)	22	4,610	48,034
12～ (%)	15,467 (57.9)	11,236 (42.1)	26,703 (100.0)	22	3,029	29,754
14～ (%)	7,018 (65.6)	3,677 (34.4)	10,695 (100.0)	11	1,330	12,036
16～ (%)	2,628 (73.3)	956 (26.7)	3,584 (100.0)		516	4,100
合計 (%)	80,773 (51.4)	76,460 (48.6)	157,233 (100.0)	132	16,207	173,572
記載なし (%)	1,065 (36.8)	1,830 (63.2)	2,895 (100.0)	26	1,716	4,637
総計 (%)	81,838 (51.1)	78,290 (48.9)	160,128 (100.0)	158	17,923	178,209
平均	10.67	9.84	10.26	9.77	10.57	10.29
標準偏差	2.81	2.67	2.77	2.69	2.90	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査