

表 610 糖尿病の既往 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	53 (43.1)	70 (56.9)	123 (100.0)		11	134
0.4～ (%)	140 (40.8)	203 (59.2)	343 (100.0)		23	366
0.6～ (%)	922 (35.1)	1,705 (64.9)	2,627 (100.0)	4	207	2,838
0.8～ (%)	5,289 (37.9)	8,662 (62.1)	13,951 (100.0)	13	1,076	15,040
1.0～ (%)	17,202 (44.1)	21,810 (55.9)	39,012 (100.0)	30	3,353	42,395
1.2～ (%)	24,236 (51.6)	22,762 (48.4)	46,998 (100.0)	31	4,739	51,768
1.4～ (%)	16,717 (59.5)	11,370 (40.5)	28,087 (100.0)	28	3,208	31,323
1.6～ (%)	7,665 (66.2)	3,917 (33.8)	11,582 (100.0)	10	1,605	13,197
1.8～ (%)	2,642 (69.4)	1,163 (30.6)	3,805 (100.0)	6	566	4,377
2.0～ (%)	1,466 (69.1)	657 (30.9)	2,123 (100.0)	2	363	2,488
合計 (%)	76,332 (51.3)	72,319 (48.7)	148,651 (100.0)	124	15,151	163,926
記載なし (%)	5,506 (48.0)	5,971 (52.0)	11,477 (100.0)	34	2,772	14,283
総計 (%)	81,838 (51.1)	78,290 (48.9)	160,128 (100.0)	158	17,923	178,209
平均	1.34	1.24	1.29	1.31	1.34	1.29
標準偏差	0.28	0.26	0.27	0.30	0.29	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査