

表 612 糖尿病の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	4,091 (35.4)	7,461 (64.6)	11,552 (100.0)	12	986	12,550
60～ (%)	2,995 (35.3)	5,478 (64.7)	8,473 (100.0)	9	643	9,125
70～ (%)	4,914 (37.8)	8,093 (62.2)	13,007 (100.0)	10	937	13,954
80～ (%)	7,445 (41.0)	10,729 (59.0)	18,174 (100.0)	14	1,495	19,683
90～ (%)	10,664 (46.7)	12,174 (53.3)	22,838 (100.0)	20	2,000	24,858
100～ (%)	13,000 (54.0)	11,096 (46.0)	24,096 (100.0)	17	2,482	26,595
110～ (%)	12,985 (61.0)	8,300 (39.0)	21,285 (100.0)	15	2,554	23,854
120～ (%)	10,298 (67.2)	5,035 (32.8)	15,333 (100.0)	14	1,991	17,338
130～ (%)	5,892 (70.3)	2,486 (29.7)	8,378 (100.0)	9	1,221	9,608
140～ (%)	4,096 (73.2)	1,501 (26.8)	5,597 (100.0)	4	848	6,449
合計 (%)	76,380 (51.4)	72,353 (48.6)	148,733 (100.0)	124	15,157	164,014
記載なし (%)	5,458 (47.9)	5,937 (52.1)	11,395 (100.0)	34	2,766	14,195
総計 (%)	81,838 (51.1)	78,290 (48.9)	160,128 (100.0)	158	17,923	178,209
平均	103.98	92.24	98.27	96.88	103.36	98.74
標準偏差	25.12	25.30	25.88	27.01	26.25	25.96

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査