

表 613 糖尿病の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	54 (39.4)	83 (60.6)	137 (100.0)	1	8	146
1.5～ (%)	270 (39.0)	423 (61.0)	693 (100.0)	6	72	771
2.0～ (%)	1,256 (43.4)	1,638 (56.6)	2,894 (100.0)	5	280	3,179
2.5～ (%)	5,095 (46.1)	5,949 (53.9)	11,044 (100.0)	20	1,086	12,150
3.0～ (%)	23,035 (48.5)	24,445 (51.5)	47,480 (100.0)	56	4,546	52,082
3.5～ (%)	48,327 (49.5)	49,208 (50.5)	97,535 (100.0)	71	9,529	107,135
4.0～ (%)	18,079 (49.2)	18,681 (50.8)	36,760 (100.0)	27	3,719	40,506
4.5～ (%)	1,164 (54.5)	971 (45.5)	2,135 (100.0)	2	225	2,362
5.0～ (%)	95 (57.9)	69 (42.1)	164 (100.0)		8	172
合計 (%)	97,375 (49.0)	101,467 (51.0)	198,842 (100.0)	188	19,473	218,503
記載なし (%)	3,083 (41.2)	4,409 (58.8)	7,492 (100.0)	42	2,934	10,468
総計 (%)	100,458 (48.7)	105,876 (51.3)	206,334 (100.0)	230	22,407	228,971
平均	3.61	3.59	3.60	3.42	3.60	3.60
標準偏差	0.43	0.45	0.44	0.59	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査