

表 614 糖尿病の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	48,286 (50.2)	47,972 (49.8)	96,258 (100.0)	82	9,189	105,529
0.2～ (%)	15,566 (48.0)	16,860 (52.0)	32,426 (100.0)	27	2,925	35,378
0.5～ (%)	7,643 (46.2)	8,894 (53.8)	16,537 (100.0)	20	1,590	18,147
1.0～ (%)	4,967 (46.0)	5,842 (54.0)	10,809 (100.0)	16	947	11,772
2.0～ (%)	3,015 (45.6)	3,599 (54.4)	6,614 (100.0)	12	628	7,254
4.0～ (%)	1,067 (45.5)	1,279 (54.5)	2,346 (100.0)	5	231	2,582
6.0～ (%)	527 (45.4)	634 (54.6)	1,161 (100.0)	3	118	1,282
8.0～ (%)	281 (44.9)	345 (55.1)	626 (100.0)	2	66	694
10.0～ (%)	357 (46.1)	417 (53.9)	774 (100.0)	1	67	842
15.0～ (%)	230 (45.5)	275 (54.5)	505 (100.0)	1	54	560
合計 (%)	81,939 (48.8)	86,117 (51.2)	168,056 (100.0)	169	15,815	184,040
記載なし (%)	18,519 (48.4)	19,759 (51.6)	38,278 (100.0)	61	6,592	44,931
総計 (%)	100,458 (48.7)	105,876 (51.3)	206,334 (100.0)	230	22,407	228,971
平均	0.61	0.67	0.64	1.10	0.64	0.64
標準偏差	1.94	1.96	1.95	2.55	1.84	1.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査