

表 615 糖尿病の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	403 (50.4)	396 (49.6)	799 (100.0)	1	74	874
7.0～ (%)	545 (47.6)	601 (52.4)	1,146 (100.0)	1	119	1,266
7.5～ (%)	2,047 (45.5)	2,455 (54.5)	4,502 (100.0)	2	467	4,971
8.0～ (%)	6,408 (43.1)	8,466 (56.9)	14,874 (100.0)	11	1,405	16,290
8.4～ (%)	1,901 (44.3)	2,388 (55.7)	4,289 (100.0)	3	384	4,676
8.5～ (%)	22,278 (45.2)	26,988 (54.8)	49,266 (100.0)	54	4,582	53,902
9.0～ (%)	29,094 (48.9)	30,397 (51.1)	59,491 (100.0)	65	5,680	65,236
9.5～ (%)	20,343 (52.8)	18,168 (47.2)	38,511 (100.0)	24	3,869	42,404
10.0～ (%)	2,576 (54.4)	2,157 (45.6)	4,733 (100.0)	5	489	5,227
10.1～ (%)	6,663 (55.8)	5,280 (44.2)	11,943 (100.0)	10	1,324	13,277
10.5～ (%)	3,254 (55.9)	2,568 (44.1)	5,822 (100.0)	4	627	6,453
11.0～ (%)	1,093 (56.5)	840 (43.5)	1,933 (100.0)	2	230	2,165
11.5～ (%)	381 (55.9)	300 (44.1)	681 (100.0)	1	87	769
12.0～ (%)	249 (51.3)	236 (48.7)	485 (100.0)		54	539
合計 (%)	97,235 (49.0)	101,240 (51.0)	198,475 (100.0)	183	19,391	218,049
記載なし (%)	3,223 (41.0)	4,636 (59.0)	7,859 (100.0)	47	3,016	10,922
総計 (%)	100,458 (48.7)	105,876 (51.3)	206,334 (100.0)	230	22,407	228,971
平均	9.23	9.13	9.18	9.14	9.22	9.18
標準偏差	0.75	0.73	0.74	0.67	0.76	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査