

表 616 糖尿病の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	3,690 (45.6)	4,399 (54.4)	8,089 (100.0)	8	864	8,961
3.0～ (%)	4,693 (47.2)	5,252 (52.8)	9,945 (100.0)	10	1,025	10,980
3.5～ (%)	8,294 (47.8)	9,074 (52.2)	17,368 (100.0)	24	1,626	19,018
4.0～ (%)	12,412 (48.4)	13,258 (51.6)	25,670 (100.0)	25	2,497	28,192
4.5～ (%)	14,969 (49.1)	15,506 (50.9)	30,475 (100.0)	27	2,966	33,468
5.0～ (%)	15,398 (50.2)	15,276 (49.8)	30,674 (100.0)	17	3,118	33,809
5.5～ (%)	13,269 (50.3)	13,089 (49.7)	26,358 (100.0)	22	2,632	29,012
6.0～ (%)	2,263 (50.8)	2,188 (49.2)	4,451 (100.0)	3	474	4,928
6.1～ (%)	7,412 (49.5)	7,573 (50.5)	14,985 (100.0)	9	1,511	16,505
6.5～ (%)	6,452 (49.2)	6,652 (50.8)	13,104 (100.0)	10	1,263	14,377
7.0～ (%)	3,901 (48.6)	4,120 (51.4)	8,021 (100.0)	10	829	8,860
7.5～ (%)	2,376 (48.7)	2,503 (51.3)	4,879 (100.0)	8	472	5,359
8.0～ (%)	1,376 (47.0)	1,549 (53.0)	2,925 (100.0)	3	264	3,192
8.5～ (%)	896 (48.9)	937 (51.1)	1,833 (100.0)	1	189	2,023
9.0～ (%)	1,359 (47.8)	1,486 (52.2)	2,845 (100.0)	6	305	3,156
合計 (%)	98,760 (49.0)	102,862 (51.0)	201,622 (100.0)	183	20,035	221,840
記載なし (%)	1,698 (36.0)	3,014 (64.0)	4,712 (100.0)	47	2,372	7,131
総計 (%)	100,458 (48.7)	105,876 (51.3)	206,334 (100.0)	230	22,407	228,971
平均	5.21	5.18	5.20	5.19	5.20	5.20
標準偏差	1.41	1.44	1.43	1.64	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査