

表 617 糖尿病の既往 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	4,181 (48.0)	4,534 (52.0)	8,715 (100.0)	7	790	9,512
20～ (%)	5,798 (46.0)	6,806 (54.0)	12,604 (100.0)	8	1,117	13,729
40～ (%)	6,237 (46.8)	7,090 (53.2)	13,327 (100.0)	12	1,186	14,525
60～ (%)	6,779 (47.5)	7,499 (52.5)	14,278 (100.0)	11	1,225	15,514
80～ (%)	6,939 (48.3)	7,425 (51.7)	14,364 (100.0)	17	1,290	15,671
100～ (%)	6,660 (47.7)	7,289 (52.3)	13,949 (100.0)	12	1,310	15,271
120～ (%)	6,559 (49.2)	6,776 (50.8)	13,335 (100.0)	13	1,238	14,586
140～ (%)	5,861 (47.7)	6,435 (52.3)	12,296 (100.0)	13	1,194	13,503
160～ (%)	5,404 (48.8)	5,662 (51.2)	11,066 (100.0)	7	1,034	12,107
180～ (%)	12,458 (49.8)	12,582 (50.2)	25,040 (100.0)	23	2,365	27,428
240～ (%)	138 (44.8)	170 (55.2)	308 (100.0)		30	338
241～ (%)	7,233 (51.0)	6,944 (49.0)	14,177 (100.0)	6	1,415	15,598
300～ (%)	4,226 (51.7)	3,945 (48.3)	8,171 (100.0)	10	811	8,992
360～ (%)	2,490 (53.7)	2,148 (46.3)	4,638 (100.0)	7	479	5,124
420～ (%)	1,505 (55.1)	1,226 (44.9)	2,731 (100.0)	4	289	3,024
480～ (%)	377 (57.1)	283 (42.9)	660 (100.0)	1	75	736
500～ (%)	623 (58.4)	444 (41.6)	1,067 (100.0)		122	1,189
540～ (%)	674 (57.7)	494 (42.3)	1,168 (100.0)		142	1,310
600～ (%)	1,204 (63.1)	705 (36.9)	1,909 (100.0)	1	222	2,132
800～ (%)	1,020 (70.4)	428 (29.6)	1,448 (100.0)	3	171	1,622
合計 (%)	86,366 (49.3)	88,885 (50.7)	175,251 (100.0)	155	16,505	191,911
記載なし (%)	1,570 (40.6)	2,296 (59.4)	3,866 (100.0)	32	777	4,675
総計 (%)	87,936 (49.1)	91,181 (50.9)	179,117 (100.0)	187	17,282	196,586
平均	179.30	159.26	169.14	183.80	178.69	169.97
標準偏差	179.23	137.24	159.64	206.41	173.79	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査