

表 622 糖尿病の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	1,031 (41.4)	1,457 (58.6)	2,488 (100.0)	2	226	2,716
50～ (%)	4,989 (42.4)	6,778 (57.6)	11,767 (100.0)	13	1,126	12,906
70～ (%)	11,996 (46.3)	13,940 (53.7)	25,936 (100.0)	24	2,572	28,532
90～ (%)	14,971 (49.2)	15,468 (50.8)	30,439 (100.0)	33	3,107	33,579
110～ (%)	12,598 (51.9)	11,664 (48.1)	24,262 (100.0)	24	2,393	26,679
130～ (%)	7,664 (52.5)	6,942 (47.5)	14,606 (100.0)	15	1,512	16,133
150～ (%)	3,771 (51.9)	3,494 (48.1)	7,265 (100.0)	8	770	8,043
170～ (%)	1,591 (49.5)	1,626 (50.5)	3,217 (100.0)	1	349	3,567
190～ (%)	587 (47.1)	660 (52.9)	1,247 (100.0)	2	89	1,338
210～ (%)	337 (45.1)	410 (54.9)	747 (100.0)	3	82	832
合計 (%)	59,535 (48.8)	62,439 (51.2)	121,974 (100.0)	125	12,226	134,325
記載なし (%)	40,923 (48.5)	43,437 (51.5)	84,360 (100.0)	105	10,181	94,646
総計 (%)	100,458 (48.7)	105,876 (51.3)	206,334 (100.0)	230	22,407	228,971
平均	108.06	104.78	106.38	108.03	106.97	106.43
標準偏差	32.72	33.80	33.32	35.91	33.25	33.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査