

表 623 糖尿病の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	22 (71.0)	9 (29.0)	31 (100.0)		4	35
60～ (%)	165 (68.8)	75 (31.3)	240 (100.0)		31	271
80～ (%)	1,370 (64.7)	746 (35.3)	2,116 (100.0)	5	256	2,377
100～ (%)	7,108 (60.4)	4,653 (39.6)	11,761 (100.0)	17	1,377	13,155
120～ (%)	21,397 (57.0)	16,109 (43.0)	37,506 (100.0)	43	4,027	41,576
140～ (%)	30,070 (51.3)	28,511 (48.7)	58,581 (100.0)	66	5,556	64,203
160～ (%)	18,789 (43.6)	24,353 (56.4)	43,142 (100.0)	33	3,668	46,843
180～ (%)	5,850 (34.8)	10,976 (65.2)	16,826 (100.0)	16	1,160	18,002
200～ (%)	1,140 (26.4)	3,173 (73.6)	4,313 (100.0)	3	199	4,515
220～ (%)	196 (23.3)	646 (76.7)	842 (100.0)	1	51	894
合計 (%)	86,107 (49.1)	89,251 (50.9)	175,358 (100.0)	184	16,329	191,871
記載なし (%)	14,351 (46.3)	16,625 (53.7)	30,976 (100.0)	46	6,078	37,100
総計 (%)	100,458 (48.7)	105,876 (51.3)	206,334 (100.0)	230	22,407	228,971
平均	147.82	155.99	151.98	147.65	148.05	151.64
標準偏差	22.99	24.40	24.07	24.76	23.17	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査