

表 624 糖尿病の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	31 (50.8)	30 (49.2)	61 (100.0)		6	67
20～ (%)	289 (53.1)	255 (46.9)	544 (100.0)		68	612
40～ (%)	7,009 (46.9)	7,944 (53.1)	14,953 (100.0)	18	1,386	16,357
60～ (%)	39,060 (47.6)	42,964 (52.4)	82,024 (100.0)	99	7,502	89,625
80～ (%)	21,739 (50.8)	21,020 (49.2)	42,759 (100.0)	34	4,047	46,840
90～ (%)	11,805 (51.9)	10,934 (48.1)	22,739 (100.0)	20	2,189	24,948
100～ (%)	5,582 (50.2)	5,532 (49.8)	11,114 (100.0)	12	1,016	12,142
120～ (%)	337 (49.5)	344 (50.5)	681 (100.0)	1	59	741
140～ (%)	26 (51.0)	25 (49.0)	51 (100.0)		6	57
合計 (%)	85,878 (49.1)	89,048 (50.9)	174,926 (100.0)	184	16,279	191,389
記載なし (%)	14,580 (46.4)	16,828 (53.6)	31,408 (100.0)	46	6,128	37,582
総計 (%)	100,458 (48.7)	105,876 (51.3)	206,334 (100.0)	230	22,407	228,971
平均	77.98	77.12	77.54	76.03	77.73	77.56
標準偏差	14.38	14.36	14.38	14.45	14.47	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査