

表 629 糖尿病の既往 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	11,352 (90.1)	1,247 (9.9)	12,599 (100.0)	15	2,462	15,076
慢性腎盂腎炎 (%)	334 (93.0)	25 (7.0)	359 (100.0)		63	422
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	203 (85.3)	35 (14.7)	238 (100.0)	1	45	284
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	267 (92.1)	23 (7.9)	290 (100.0)	1	68	359
その他の分類不能 の腎炎 (%)	152 (92.1)	13 (7.9)	165 (100.0)		30	195
多発性嚢胞腎 (%)	1,125 (92.7)	88 (7.3)	1,213 (100.0)	1	250	1,464
腎硬化症 (%)	2,057 (84.2)	385 (15.8)	2,442 (100.0)	2	442	2,886
悪性高血圧 (%)	215 (86.7)	33 (13.3)	248 (100.0)	1	63	312
糖尿病性腎症 (%)	3 (0.0)	13,043 (100.0)	13,046 (100.0)		127	13,173
SLE腎炎 (%)	282 (88.4)	37 (11.6)	319 (100.0)		44	363
アミロイド腎 (%)	42 (85.7)	7 (14.3)	49 (100.0)		10	59
痛風腎 (%)	121 (93.8)	8 (6.2)	129 (100.0)	1	24	154
先天性代謝異常に よる腎不全 (%)	31 (88.6)	4 (11.4)	35 (100.0)		9	44
腎・尿路結核 (%)	17 (94.4)	1 (5.6)	18 (100.0)		4	22
腎・尿路結石 (%)	49 (84.5)	9 (15.5)	58 (100.0)		11	69
腎・尿路腫瘍 (%)	65 (87.8)	9 (12.2)	74 (100.0)		11	85
閉塞性尿路障害 (%)	52 (83.9)	10 (16.1)	62 (100.0)		12	74
骨髄腫 (%)	15 (83.3)	3 (16.7)	18 (100.0)		1	19
腎形成不全 (%)	85 (95.5)	4 (4.5)	89 (100.0)		12	101
不明 (%)	2,321 (82.4)	497 (17.6)	2,818 (100.0)	26	636	3,480
再導入 (%)	324 (90.5)	34 (9.5)	358 (100.0)		58	416
その他 (%)	573 (79.0)	152 (21.0)	725 (100.0)	2	162	889
合計 (%)	19,685 (55.7)	15,667 (44.3)	35,352 (100.0)	50	4,544	39,946
記載なし (%)						
総計 (%)	19,685 (55.7)	15,667 (44.3)	35,352 (100.0)	50	4,544	39,946

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査