

表 641 糖尿病の既往 血流量(ml/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

血流量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)					1	1
100～ (%)	18 (52.9)	16 (47.1)	34 (100.0)		3	37
120～ (%)	50 (58.1)	36 (41.9)	86 (100.0)		8	94
140～ (%)	593 (50.0)	594 (50.0)	1,187 (100.0)	2	153	1,342
160～ (%)	292 (57.5)	216 (42.5)	508 (100.0)	1	69	578
180～ (%)	1,349 (52.9)	1,200 (47.1)	2,549 (100.0)	1	396	2,946
200～ (%)	6,521 (54.3)	5,490 (45.7)	12,011 (100.0)	7	1,529	13,547
220～ (%)	3,363 (57.3)	2,503 (42.7)	5,866 (100.0)	2	739	6,607
240～ (%)	4,721 (57.6)	3,474 (42.4)	8,195 (100.0)	8	924	9,127
260～ (%)	566 (58.0)	410 (42.0)	976 (100.0)	1	101	1,078
280～ (%)	520 (57.5)	384 (42.5)	904 (100.0)		116	1,020
300～ (%)	1,309 (57.9)	950 (42.1)	2,259 (100.0)	12	194	2,465
350～ (%)	181 (59.2)	125 (40.8)	306 (100.0)	2	37	345
400～ (%)	104 (59.8)	70 (40.2)	174 (100.0)	1	27	202
合計 (%)	19,587 (55.9)	15,468 (44.1)	35,055 (100.0)	37	4,297	39,389
記載なし (%)	98 (33.0)	199 (67.0)	297 (100.0)	13	247	557
総計 (%)	19,685 (55.7)	15,667 (44.3)	35,352 (100.0)	50	4,544	39,946
平均	225.75	222.91	224.50	254.86	221.30	224.18
標準偏差	40.62	40.09	40.41	58.72	39.49	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査