

表 644 糖尿病の既往 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	58 (64.4)	32 (35.6)	90 (100.0)		7	97
0.0～ (%)	696 (59.0)	484 (41.0)	1,180 (100.0)	3	137	1,320
1.0～ (%)	4,195 (64.2)	2,341 (35.8)	6,536 (100.0)	9	855	7,400
2.0～ (%)	7,784 (60.1)	5,164 (39.9)	12,948 (100.0)	19	1,687	14,654
3.0～ (%)	3,883 (54.0)	3,311 (46.0)	7,194 (100.0)	7	813	8,014
4.0～ (%)	938 (46.9)	1,062 (53.1)	2,000 (100.0)	1	190	2,191
5.0～ (%)	149 (41.0)	214 (59.0)	363 (100.0)		37	400
6.0～ (%)	28 (52.8)	25 (47.2)	53 (100.0)		6	59
7.0～ (%)	5 (31.3)	11 (68.8)	16 (100.0)			16
8.0～ (%)	14 (51.9)	13 (48.1)	27 (100.0)		3	30
合計 (%)	17,750 (58.4)	12,657 (41.6)	30,407 (100.0)	39	3,735	34,181
記載なし (%)	155 (35.8)	278 (64.2)	433 (100.0)	8	349	790
総計 (%)	17,905 (58.1)	12,935 (41.9)	30,840 (100.0)	47	4,084	34,971
平均	2.50	2.69	2.58	2.29	2.51	2.57
標準偏差	0.98	1.10	1.03	0.82	1.01	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査