

表 645 糖尿病の既往 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	308 (57.5)	228 (42.5)	536 (100.0)	1	50	587
1.0～ (%)	532 (54.9)	437 (45.1)	969 (100.0)	2	120	1,091
2.0～ (%)	1,559 (57.3)	1,161 (42.7)	2,720 (100.0)	2	308	3,030
3.0～ (%)	3,524 (57.0)	2,661 (43.0)	6,185 (100.0)	2	706	6,893
4.0～ (%)	4,839 (58.0)	3,503 (42.0)	8,342 (100.0)	14	1,021	9,377
5.0～ (%)	3,840 (58.5)	2,721 (41.5)	6,561 (100.0)	8	855	7,424
6.0～ (%)	2,004 (61.3)	1,265 (38.7)	3,269 (100.0)	9	447	3,725
7.0～ (%)	780 (62.8)	463 (37.2)	1,243 (100.0)	1	164	1,408
8.0～ (%)	250 (63.5)	144 (36.5)	394 (100.0)		42	436
9.0～ (%)	104 (60.8)	67 (39.2)	171 (100.0)		19	190
合計 (%)	17,740 (58.4)	12,650 (41.6)	30,390 (100.0)	39	3,732	34,161
記載なし (%)	165 (36.7)	285 (63.3)	450 (100.0)	8	352	810
総計 (%)	17,905 (58.1)	12,935 (41.9)	30,840 (100.0)	47	4,084	34,971
平均	4.62	4.52	4.58	4.87	4.66	4.59
標準偏差	1.61	1.57	1.59	1.59	1.54	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査