

表 648 糖尿病の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	1 (33.3)	2 (66.7)	3 (100.0)			3
2～ (%)	50 (37.6)	83 (62.4)	133 (100.0)		14	147
4～ (%)	314 (38.0)	513 (62.0)	827 (100.0)	1	90	918
6～ (%)	1,576 (46.4)	1,821 (53.6)	3,397 (100.0)	7	346	3,750
8～ (%)	4,268 (54.3)	3,594 (45.7)	7,862 (100.0)	16	869	8,747
10～ (%)	5,438 (60.2)	3,592 (39.8)	9,030 (100.0)	12	1,105	10,147
12～ (%)	3,783 (64.4)	2,092 (35.6)	5,875 (100.0)	2	761	6,638
14～ (%)	1,692 (68.8)	769 (31.2)	2,461 (100.0)	1	358	2,820
16～ (%)	693 (77.5)	201 (22.5)	894 (100.0)		154	1,048
合計 (%)	17,815 (58.4)	12,667 (41.6)	30,482 (100.0)	39	3,697	34,218
記載なし (%)	90 (25.1)	268 (74.9)	358 (100.0)	8	387	753
総計 (%)	17,905 (58.1)	12,935 (41.9)	30,840 (100.0)	47	4,084	34,971
平均	11.04	10.19	10.69	9.59	11.00	10.72
標準偏差	2.63	2.59	2.65	1.94	2.72	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査