

表 652 糖尿病の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| %クレアチニン<br>産生速度 | 既往なし             | 既往あり             | 合計                | 不明     | 記載なし   | 総計     |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 60未満<br>(%)     | 539<br>(35.8)    | 966<br>(64.2)    | 1,505<br>(100.0)  | 1      | 128    | 1,634  |
| 60～<br>(%)      | 528<br>(41.2)    | 753<br>(58.8)    | 1,281<br>(100.0)  | 2      | 121    | 1,404  |
| 70～<br>(%)      | 1,002<br>(44.2)  | 1,265<br>(55.8)  | 2,267<br>(100.0)  | 1      | 210    | 2,478  |
| 80～<br>(%)      | 1,676<br>(47.1)  | 1,880<br>(52.9)  | 3,556<br>(100.0)  | 3      | 309    | 3,868  |
| 90～<br>(%)      | 2,468<br>(53.7)  | 2,129<br>(46.3)  | 4,597<br>(100.0)  | 11     | 492    | 5,100  |
| 100～<br>(%)     | 3,167<br>(61.1)  | 2,019<br>(38.9)  | 5,186<br>(100.0)  | 6      | 642    | 5,834  |
| 110～<br>(%)     | 3,241<br>(67.5)  | 1,559<br>(32.5)  | 4,800<br>(100.0)  | 11     | 588    | 5,399  |
| 120～<br>(%)     | 2,467<br>(73.6)  | 885<br>(26.4)    | 3,352<br>(100.0)  | 3      | 488    | 3,843  |
| 130～<br>(%)     | 1,321<br>(74.3)  | 458<br>(25.7)    | 1,779<br>(100.0)  | 1      | 312    | 2,092  |
| 140～<br>(%)     | 824<br>(74.7)    | 279<br>(25.3)    | 1,103<br>(100.0)  |        | 205    | 1,308  |
| 合計<br>(%)       | 17,233<br>(58.6) | 12,193<br>(41.4) | 29,426<br>(100.0) | 39     | 3,495  | 32,960 |
| 記載なし<br>(%)     | 672<br>(47.5)    | 742<br>(52.5)    | 1,414<br>(100.0)  | 8      | 589    | 2,011  |
| 総計<br>(%)       | 17,905<br>(58.1) | 12,935<br>(41.9) | 30,840<br>(100.0) | 47     | 4,084  | 34,971 |
| 平均              | 106.04           | 94.81            | 101.39            | 102.23 | 106.42 | 101.92 |
| 標準偏差            | 22.48            | 24.01            | 23.77             | 17.13  | 24.31  | 23.87  |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査