

表 653 糖尿病の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	6 (60.0)	4 (40.0)	10 (100.0)			10
1.5～ (%)	19 (33.3)	38 (66.7)	57 (100.0)		5	62
2.0～ (%)	104 (38.2)	168 (61.8)	272 (100.0)	2	20	294
2.5～ (%)	633 (50.9)	611 (49.1)	1,244 (100.0)	1	147	1,392
3.0～ (%)	4,356 (55.3)	3,523 (44.7)	7,879 (100.0)	7	921	8,807
3.5～ (%)	10,468 (56.6)	8,024 (43.4)	18,492 (100.0)	20	2,073	20,585
4.0～ (%)	3,664 (57.3)	2,727 (42.7)	6,391 (100.0)	6	761	7,158
4.5～ (%)	178 (62.0)	109 (38.0)	287 (100.0)	1	29	317
5.0～ (%)	14 (82.4)	3 (17.6)	17 (100.0)		1	18
合計 (%)	19,442 (56.1)	15,207 (43.9)	34,649 (100.0)	37	3,957	38,643
記載なし (%)	243 (34.6)	460 (65.4)	703 (100.0)	13	587	1,303
総計 (%)	19,685 (55.7)	15,667 (44.3)	35,352 (100.0)	50	4,544	39,946
平均	3.65	3.62	3.64	3.62	3.64	3.64
標準偏差	0.38	0.40	0.39	0.49	0.38	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査