

表 654 糖尿病の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	10,734 (57.9)	7,819 (42.1)	18,553 (100.0)	17	2,134	20,704
0.2～ (%)	3,175 (54.2)	2,686 (45.8)	5,861 (100.0)	6	610	6,477
0.5～ (%)	1,486 (52.2)	1,363 (47.8)	2,849 (100.0)	1	323	3,173
1.0～ (%)	913 (50.9)	880 (49.1)	1,793 (100.0)	1	209	2,003
2.0～ (%)	514 (50.3)	508 (49.7)	1,022 (100.0)	1	111	1,134
4.0～ (%)	180 (50.6)	176 (49.4)	356 (100.0)		51	407
6.0～ (%)	72 (46.8)	82 (53.2)	154 (100.0)	1	16	171
8.0～ (%)	36 (43.4)	47 (56.6)	83 (100.0)		11	94
10.0～ (%)	44 (46.8)	50 (53.2)	94 (100.0)		14	108
15.0～ (%)	28 (40.0)	42 (60.0)	70 (100.0)	1	13	84
合計 (%)	17,182 (55.7)	13,653 (44.3)	30,835 (100.0)	28	3,492	34,355
記載なし (%)	2,503 (55.4)	2,014 (44.6)	4,517 (100.0)	22	1,052	5,591
総計 (%)	19,685 (55.7)	15,667 (44.3)	35,352 (100.0)	50	4,544	39,946
平均	0.49	0.62	0.55	1.18	0.61	0.55
標準偏差	1.56	1.84	1.69	3.57	2.27	1.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査