

表 655 糖尿病の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	74 (50.3)	73 (49.7)	147 (100.0)		13	160
7.0～ (%)	152 (64.4)	84 (35.6)	236 (100.0)		23	259
7.5～ (%)	499 (59.0)	347 (41.0)	846 (100.0)		105	951
8.0～ (%)	1,419 (54.9)	1,167 (45.1)	2,586 (100.0)	1	281	2,868
8.4～ (%)	408 (54.3)	343 (45.7)	751 (100.0)		67	818
8.5～ (%)	4,412 (52.5)	3,999 (47.5)	8,411 (100.0)	6	884	9,301
9.0～ (%)	5,728 (55.3)	4,634 (44.7)	10,362 (100.0)	14	1,139	11,515
9.5～ (%)	4,006 (59.3)	2,753 (40.7)	6,759 (100.0)	10	843	7,612
10.0～ (%)	475 (60.5)	310 (39.5)	785 (100.0)		118	903
10.1～ (%)	1,299 (59.6)	880 (40.4)	2,179 (100.0)	4	269	2,452
10.5～ (%)	639 (62.4)	385 (37.6)	1,024 (100.0)		146	1,170
11.0～ (%)	214 (62.9)	126 (37.1)	340 (100.0)	1	42	383
11.5～ (%)	61 (51.3)	58 (48.7)	119 (100.0)	1	12	132
12.0～ (%)	43 (67.2)	21 (32.8)	64 (100.0)		7	71
合計 (%)	19,429 (56.1)	15,180 (43.9)	34,609 (100.0)	37	3,949	38,595
記載なし (%)	256 (34.5)	487 (65.5)	743 (100.0)	13	595	1,351
総計 (%)	19,685 (55.7)	15,667 (44.3)	35,352 (100.0)	50	4,544	39,946
平均	9.21	9.15	9.18	9.49	9.24	9.19
標準偏差	0.76	0.73	0.75	0.68	0.74	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査