

表 657 糖尿病の既往 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	922 (60.1)	611 (39.9)	1,533 (100.0)	3	147	1,683
20～ (%)	1,069 (54.2)	903 (45.8)	1,972 (100.0)	2	221	2,195
40～ (%)	1,167 (53.1)	1,030 (46.9)	2,197 (100.0)	1	239	2,437
60～ (%)	1,240 (53.2)	1,091 (46.8)	2,331 (100.0)	6	255	2,592
80～ (%)	1,373 (53.4)	1,198 (46.6)	2,571 (100.0)	5	270	2,846
100～ (%)	1,347 (54.1)	1,144 (45.9)	2,491 (100.0)		304	2,795
120～ (%)	1,285 (55.4)	1,033 (44.6)	2,318 (100.0)		263	2,581
140～ (%)	1,136 (54.5)	947 (45.5)	2,083 (100.0)	3	237	2,323
160～ (%)	1,018 (53.0)	904 (47.0)	1,922 (100.0)	4	224	2,150
180～ (%)	2,543 (56.6)	1,946 (43.4)	4,489 (100.0)	4	512	5,005
240～ (%)	42 (59.2)	29 (40.8)	71 (100.0)		6	77
241～ (%)	1,538 (57.7)	1,127 (42.3)	2,665 (100.0)	1	289	2,955
300～ (%)	897 (59.0)	623 (41.0)	1,520 (100.0)	2	192	1,714
360～ (%)	573 (62.5)	344 (37.5)	917 (100.0)	2	123	1,042
420～ (%)	321 (63.3)	186 (36.7)	507 (100.0)	2	82	591
480～ (%)	89 (65.9)	46 (34.1)	135 (100.0)		11	146
500～ (%)	128 (64.0)	72 (36.0)	200 (100.0)		37	237
540～ (%)	138 (63.0)	81 (37.0)	219 (100.0)	1	32	252
600～ (%)	255 (66.6)	128 (33.4)	383 (100.0)		40	423
800～ (%)	240 (75.9)	76 (24.1)	316 (100.0)	1	33	350
合計 (%)	17,321 (56.2)	13,519 (43.8)	30,840 (100.0)	37	3,517	34,394
記載なし (%)	265 (44.0)	337 (56.0)	602 (100.0)	6	126	734
総計 (%)	17,586 (55.9)	13,856 (44.1)	31,442 (100.0)	43	3,643	35,128
平均	185.94	164.81	176.68	188.35	182.22	177.26
標準偏差	188.43	141.36	169.74	172.84	166.85	169.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査