

表 660 糖尿病の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	333 (37.0)	566 (63.0)	899 (100.0)	1	92	992
100～ (%)	1,155 (42.8)	1,546 (57.2)	2,701 (100.0)	4	283	2,988
120～ (%)	2,618 (51.2)	2,493 (48.8)	5,111 (100.0)	5	578	5,694
140～ (%)	3,469 (56.0)	2,725 (44.0)	6,194 (100.0)	8	703	6,905
160～ (%)	3,190 (59.6)	2,165 (40.4)	5,355 (100.0)	5	651	6,011
180～ (%)	2,174 (63.5)	1,249 (36.5)	3,423 (100.0)	5	445	3,873
200～ (%)	1,296 (65.5)	682 (34.5)	1,978 (100.0)	5	270	2,253
220～ (%)	587 (69.8)	254 (30.2)	841 (100.0)	2	113	956
240～ (%)	226 (66.3)	115 (33.7)	341 (100.0)		43	384
260～ (%)	116 (67.1)	57 (32.9)	173 (100.0)		43	216
合計 (%)	15,164 (56.1)	11,852 (43.9)	27,016 (100.0)	35	3,221	30,272
記載なし (%)	4,521 (54.2)	3,815 (45.8)	8,336 (100.0)	15	1,323	9,674
総計 (%)	19,685 (55.7)	15,667 (44.3)	35,352 (100.0)	50	4,544	39,946
平均	162.28	151.68	157.63	162.00	161.08	158.00
標準偏差	35.26	34.99	35.53	39.14	36.88	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査