

表 663 糖尿病の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
60～ (%)	75 (75.8)	24 (24.2)	99 (100.0)		16	115
80～ (%)	403 (72.6)	152 (27.4)	555 (100.0)	2	58	615
100～ (%)	1,715 (69.2)	762 (30.8)	2,477 (100.0)	1	322	2,800
120～ (%)	4,322 (64.5)	2,383 (35.5)	6,705 (100.0)	9	925	7,639
140～ (%)	6,002 (58.7)	4,215 (41.3)	10,217 (100.0)	11	1,205	11,433
160～ (%)	3,666 (48.9)	3,831 (51.1)	7,497 (100.0)	11	800	8,308
180～ (%)	1,115 (38.3)	1,793 (61.7)	2,908 (100.0)	1	245	3,154
200～ (%)	221 (28.7)	548 (71.3)	769 (100.0)	1	52	822
220～ (%)	44 (21.9)	157 (78.1)	201 (100.0)		15	216
合計 (%)	17,565 (55.9)	13,865 (44.1)	31,430 (100.0)	36	3,638	35,104
記載なし (%)	2,120 (54.1)	1,802 (45.9)	3,922 (100.0)	14	906	4,842
総計 (%)	19,685 (55.7)	15,667 (44.3)	35,352 (100.0)	50	4,544	39,946
平均	146.39	156.85	151.01	149.28	147.72	150.67
標準偏差	23.85	25.58	25.17	24.11	23.74	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査