

表 676 糖尿病の既往 降圧薬使用の有無別（腹膜透析患者）

| 降圧薬使用の有無 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|----------|--------|--------|---------|----|-------|-------|
| なし | 834 | 429 | 1,263 | 4 | 20 | 1,287 |
| (%) | (66.0) | (34.0) | (100.0) | | | |
| あり | 2,670 | 1,988 | 4,658 | 12 | 222 | 4,892 |
| (%) | (57.3) | (42.7) | (100.0) | | | |
| 合計 | 3,504 | 2,417 | 5,921 | 16 | 242 | 6,179 |
| (%) | (59.2) | (40.8) | (100.0) | | | |
| 不明 | 28 | 37 | 65 | 5 | 1 | 71 |
| (%) | (43.1) | (56.9) | (100.0) | | | |
| 記載なし | 141 | 798 | 939 | 5 | 1,747 | 2,691 |
| (%) | (15.0) | (85.0) | (100.0) | | | |
| 総計 | 3,673 | 3,252 | 6,925 | 26 | 1,990 | 8,941 |
| (%) | (53.0) | (47.0) | (100.0) | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査