

表 683 糖尿病の既往 クレアチニン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

クレアチニン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	10 (66.7)	5 (33.3)	15 (100.0)		2	17
2～ (%)	70 (50.7)	68 (49.3)	138 (100.0)		16	154
4～ (%)	260 (47.8)	284 (52.2)	544 (100.0)	1	30	575
6～ (%)	540 (50.1)	538 (49.9)	1,078 (100.0)	3	52	1,133
8～ (%)	746 (59.1)	517 (40.9)	1,263 (100.0)	3	83	1,349
10～ (%)	609 (61.2)	386 (38.8)	995 (100.0)	5	115	1,115
12～ (%)	484 (62.3)	293 (37.7)	777 (100.0)	5	66	848
14～ (%)	286 (65.0)	154 (35.0)	440 (100.0)	3	45	488
16～ (%)	197 (75.2)	65 (24.8)	262 (100.0)	1	32	295
合計 (%)	3,202 (58.1)	2,310 (41.9)	5,512 (100.0)	21	441	5,974
記載なし (%)	471 (33.3)	942 (66.7)	1,413 (100.0)	5	1,549	2,967
総計 (%)	3,673 (53.0)	3,252 (47.0)	6,925 (100.0)	26	1,990	8,941
平均	10.23	9.27	9.83	10.92	10.56	9.89
標準偏差	3.62	3.30	3.52	3.13	3.60	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査