

表 684 糖尿病の既往 アルブミン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	7 (53.8)	6 (46.2)	13 (100.0)		2	15
1.5～ (%)	30 (44.8)	37 (55.2)	67 (100.0)		4	71
2.0～ (%)	125 (44.2)	158 (55.8)	283 (100.0)		15	298
2.5～ (%)	495 (52.2)	454 (47.8)	949 (100.0)	2	86	1,037
3.0～ (%)	1,137 (57.2)	851 (42.8)	1,988 (100.0)	10	160	2,158
3.5～ (%)	1,094 (62.1)	667 (37.9)	1,761 (100.0)	6	139	1,906
4.0～ (%)	264 (65.7)	138 (34.3)	402 (100.0)	2	27	431
4.5～ (%)	14 (70.0)	6 (30.0)	20 (100.0)		1	21
5.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	3,168 (57.8)	2,317 (42.2)	5,485 (100.0)	20	434	5,939
記載なし (%)	505 (35.1)	935 (64.9)	1,440 (100.0)	6	1,556	3,002
総計 (%)	3,673 (53.0)	3,252 (47.0)	6,925 (100.0)	26	1,990	8,941
平均	3.33	3.21	3.28	3.40	3.27	3.28
標準偏差	0.51	0.53	0.52	0.41	0.49	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査