

表 685 糖尿病の既往 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	1,762 (61.9)	1,083 (38.1)	2,845 (100.0)	4	218	3,067
0.2～ (%)	494 (53.6)	428 (46.4)	922 (100.0)	5	68	995
0.5～ (%)	222 (53.2)	195 (46.8)	417 (100.0)	1	31	449
1.0～ (%)	145 (51.4)	137 (48.6)	282 (100.0)	2	24	308
2.0～ (%)	93 (47.7)	102 (52.3)	195 (100.0)		7	202
4.0～ (%)	41 (53.2)	36 (46.8)	77 (100.0)	1	5	83
6.0～ (%)	20 (51.3)	19 (48.7)	39 (100.0)		1	40
8.0～ (%)	12 (52.2)	11 (47.8)	23 (100.0)		1	24
10.0～ (%)	18 (54.5)	15 (45.5)	33 (100.0)		1	34
15.0～ (%)	4 (57.1)	3 (42.9)	7 (100.0)			7
合計 (%)	2,811 (58.1)	2,029 (41.9)	4,840 (100.0)	13	356	5,209
記載なし (%)	862 (41.3)	1,223 (58.7)	2,085 (100.0)	13	1,634	3,732
総計 (%)	3,673 (53.0)	3,252 (47.0)	6,925 (100.0)	26	1,990	8,941
平均	0.58	0.73	0.64	0.83	0.45	0.63
標準偏差	1.61	1.92	1.75	1.50	1.15	1.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査