

表 688 糖尿病の既往 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	52 (47.7)	57 (52.3)	109 (100.0)		14	123
20～ (%)	141 (55.7)	112 (44.3)	253 (100.0)		28	281
40～ (%)	132 (55.2)	107 (44.8)	239 (100.0)	1	28	268
60～ (%)	184 (62.4)	111 (37.6)	295 (100.0)	1	19	315
80～ (%)	157 (54.7)	130 (45.3)	287 (100.0)		22	309
100～ (%)	164 (56.9)	124 (43.1)	288 (100.0)	2	26	316
120～ (%)	166 (59.3)	114 (40.7)	280 (100.0)		25	305
140～ (%)	159 (59.6)	108 (40.4)	267 (100.0)		18	285
160～ (%)	156 (60.5)	102 (39.5)	258 (100.0)		18	276
180～ (%)	355 (59.0)	247 (41.0)	602 (100.0)		52	654
240～ (%)	7 (70.0)	3 (30.0)	10 (100.0)			10
241～ (%)	235 (59.0)	163 (41.0)	398 (100.0)	3	30	431
300～ (%)	191 (62.0)	117 (38.0)	308 (100.0)	1	22	331
360～ (%)	96 (55.5)	77 (44.5)	173 (100.0)	1	26	200
420～ (%)	78 (60.9)	50 (39.1)	128 (100.0)		11	139
480～ (%)	25 (64.1)	14 (35.9)	39 (100.0)		4	43
500～ (%)	26 (53.1)	23 (46.9)	49 (100.0)		5	54
540～ (%)	43 (64.2)	24 (35.8)	67 (100.0)		6	73
600～ (%)	74 (75.5)	24 (24.5)	98 (100.0)	2	5	105
800～ (%)	79 (78.2)	22 (21.8)	101 (100.0)		9	110
合計 (%)	2,520 (59.3)	1,729 (40.7)	4,249 (100.0)	11	368	4,628
記載なし (%)	172 (52.4)	156 (47.6)	328 (100.0)		48	376
総計 (%)	2,692 (58.8)	1,885 (41.2)	4,577 (100.0)	11	416	5,004
平均	238.06	201.27	223.09	313.27	230.29	223.88
標準偏差	246.83	171.08	219.91	255.78	317.97	229.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査