

表 691 糖尿病の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

総コレステロール 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	18 (40.0)	27 (60.0)	45 (100.0)		5	50
100～ (%)	61 (42.4)	83 (57.6)	144 (100.0)		16	160
120～ (%)	203 (47.9)	221 (52.1)	424 (100.0)		24	448
140～ (%)	380 (51.4)	360 (48.6)	740 (100.0)	3	63	806
160～ (%)	467 (58.3)	334 (41.7)	801 (100.0)	4	60	865
180～ (%)	508 (65.4)	269 (34.6)	777 (100.0)	1	55	833
200～ (%)	332 (65.0)	179 (35.0)	511 (100.0)	2	51	564
220～ (%)	203 (68.8)	92 (31.2)	295 (100.0)	1	22	318
240～ (%)	90 (62.5)	54 (37.5)	144 (100.0)	1	14	159
260～ (%)	90 (66.7)	45 (33.3)	135 (100.0)		14	149
合計 (%)	2,352 (58.6)	1,664 (41.4)	4,016 (100.0)	12	324	4,352
記載なし (%)	1,321 (45.4)	1,588 (54.6)	2,909 (100.0)	14	1,666	4,589
総計 (%)	3,673 (53.0)	3,252 (47.0)	6,925 (100.0)	26	1,990	8,941
平均	183.69	172.13	178.90	183.00	180.27	179.01
標準偏差	40.35	39.70	40.48	30.16	41.65	40.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査